


สถานการณ์โรคไข้เลือดออก

ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในประเทศไทย ปี 2566 (ความชุกสูงสุด 10 อันดับ)

จังหวัด	ป่วย	ตาย	อัตราป่วย	อัตราตาย	อัตราป่วยตาย
1 Songkhla	989	2	69.11	0.14	0.2
2 Trat	157	0	68.92	0	0
3 Narathiwat	495	0	60.8	0	0
4 Phuket	247	0	59.11	0	0
5 Samut Sakhon	348	0	59.04	0	0
6 Rayong	438	0	57.68	0	0
7 Nan	255	0	53.74	0	0
8 Phangnga	139	0	51.97	0	0
9 Pattani	377	0	51.44	0	0
10 Krabi	244	0	50.83	0	0
66 Nakhon Ratchasima	139	1	5.29	0.04	0.72
รวมทั้งประเทศ	14,811	13	22.41	0.02	0.09



จังหวัด ที่มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเสียชีวิต ปี 2566

จังหวัด	ป่วย	ตาย	อัตราป่วย	อัตราตาย	อัตราป่วยตาย
1 Satun	105	1	32.28	0.31	0.95
2 Pathum Thani	538	3	44.78	0.25	0.56
3 Chanthaburi	264	1	49.24	0.19	0.38
4 Prachuap Khiri Khan	120	1	21.69	0.18	0.83
5 Trang	134	1	21	0.16	0.75
6 Songkhla	989	2	69.11	0.14	0.2
7 Surat Thani	179	1	16.67	0.09	0.56
8 Chon Buri	630	1	39.5	0.06	0.16
9 Nakhon Ratchasima	139	1	5.29	0.04	0.72
10 Bangkok	2535	1	46.13	0.02	0.04
รวมทั้งประเทศ	14,811	13	22.41	0.02	0.09

ประเทศไทยเสียชีวิต

13 ราย

นครราชสีมาเสียชีวิต

1 ราย


ข้อมูลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในจังหวัด **เขตสุขภาพที่ 9 และภูมิภาค** ปี 2566

จังหวัด	ป่วย	ตาย	อัตราป่วย	อัตรตาย	อัตราป่วยตาย
Surin	129	0	9.4	0	0
Chaiyaphum	62	0	5.55	0	0
Nakhon Ratchasima	139	1	5.29	0.04	0.72
Buri Ram	50	0	3.17	0	0
รวม	380	1	5.67	0.01	0.26


ในเขตสุขภาพที่ 9 (นครชัยบุรีนทร์) จ.สุรินทร์ มีอัตราป่วยสูงเป็นอันดับ 1 รองลงมาคือ ชัยภูมิ นครราชสีมา และ บุรีรัมย์

สถานการณ์ไข้เลือดออกในแต่ละภูมิภาค จากกราฟแสดงให้เห็นว่าภาคกลางมีการระบาดมากที่สุด มาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วจนถึงต้นปี 2566

Number of cases by week of onset and region. 2565



Number of cases by week of onset and region. 2566



สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่ **จังหวัดนครราชสีมา** ข้อมูล ณ 27 มิ.ย. 66

จำนวนผู้ป่วยสะสม


344 ราย

จำนวนผู้ป่วยเสียชีวิต

1 ราย




จำนวนผู้ป่วยในปี 2566 ในช่วงเดือน พ.ค.-
มิ.ย. 66 ยังอยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่าค่ามัธยฐาน แต่มี
แนวโน้มสูงขึ้น และสูงกว่าปี 2565



	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
2022	8	11	9	19	64	92	110	193	94	54	56	34
Median	28	23	33	58	251	671	510	567	432	86	56	34
2023	26	24	33	57	67	137						



ความชุก ความรุนแรง และแนวโน้มสถานการณ์ ข้อมูล ณ 27 มิ.ย. 66

ปี พ.ศ.	อัตราป่วย	อัตราตาย
2561	143.64 (3692)	0.12 (3)
2562	378.4 (9613)	0.24 (6)
2563	244.13 (6202)	0.12 (3)
2564	5.75 (148)	0.04 (1)
2565	29.29 (744)	0.00 (0)
2566	13.54 (344)	0.04 (1)



ลักษณะการกระจายของผู้ป่วยไข้เลือดออก ข้อมูล ณ 27 มิ.ย. 66

อำเภอ	ป่วย	ตาย	อัตราป่วย	อัตราตาย	อัตราป่วยตาย
เสิงสาง	35		54.08		
ด่านขุนทด	61		48.19		
บัวใหญ่	28		32.46		
สีคิ้ว	31	1	25.82	0.83	3.23
ชุมพวง	18		22.17		
หนองบุญมาก	12		21.22		
ปากช่อง	36		20.53		
บัวลาย	5		20.05		
สีดา	4		16.39		
โนนไทย	11		14.4		
ห้วยแถลง	10		13.16		
โนนสูง	16		12.42		
โชคชัย	9		12.23		
ขามสะแกแสง	5		11.59		
ขามทะเลสอ	3		10.6		
เทพารักษ์	3		10.53		
ลำทะเมนชัย	3		9.39		
แก่งสนามนาง	3		7.95		
โนนแดง	2		7.68		
วังน้ำเขียว	3		7.41		
เมือง	26		6.11		
ประทาย	4		5.21		
บ้านเหลื่อม	1		4.56		
เมืองยาง	1		4.26		
สูงเนิน	3		3.97		
ครบุรี	3		3.18		
เฉลิมพระเกียรติ	1		3.03		
พระทองคำ	1		2.28		
ปักธงชัย	2		1.71		
พิมาย	2		1.54		
จักราช	1		1.5		
คง	1		1.23		





นโยบายใช้เลือดออก จังหวัดนครราชสีมา

เป้าหมาย : ลดอัตราตายด้วยโรคใช้เลือดออก

1

ต้องมีระบบ Dengue alert และ Dengue corner ทุกโรงพยาบาล

2

ผู้ป่วยที่มีประวัติไข้ หรือสงสัยไข้เลือดออก ให้ซักประวัติย้อนหลัง 5 – 7 วันทุกราย

3

ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกทุกราย ให้ใช้ Dengue chart ตามแนวทางไข้เลือดออก จังหวัดนครราชสีมา

4

จัดเตรียม Dextran ให้เพียงพอต่อการรักษาผู้ป่วย

5

ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกทุกรายที่ Refer รพ.มหาราช หรือ รพ.แห่งอื่นๆ ให้ส่งข้อมูลเข้าไลน์กลุ่ม Dengue korat

6

กรณี ผู้ป่วยมีอาการรุนแรง หรือผู้ป่วย Refer ให้เก็บตัวอย่าง Plasma หรือ Serum ใส่ Tube sterile 5 CC จำนวน 1 หลอด ไว้ที่ห้อง Lab ของรพ.

7

กรณีผู้ป่วยมีอาการรุนแรง หรือผู้ป่วย Refer ให้ดำเนินการทำ Case conference ทุกรายทันที ไม่เกิน 3 วัน ในโรงพยาบาลของท่าน

8

กรณีมีผู้ป่วยเสียชีวิต ให้ทีมรักษา และทีมควบคุมโรคเตรียมข้อมูล นำเสนอ Dead Case Conference ที่สสจ.นครราชสีมา

9

ให้เฝ้าระวังผู้ป่วยในกลุ่มเสี่ยง เช่น โรคธาลัสซีเมีย, โรคอ้วน และ Alcoholism

10

เน้นย้ำ ร้านขายยา, คลินิก, สถานบริการสาธารณสุข ให้งดเว้นการใช้ยา NSAIDs ในช่วงฤดูกาลระบาดของไข้เลือดออก

11

เน้นการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในโรงพยาบาลทุกวัน เรื่องการป้องกัน ควบคุม และอาการผิดปกติที่ควรมาพบแพทย์

