

มาตรการควบคุม




โรคไข้เลือดออก




มาตรการควบคุมโรคใช้เลือดออก 3-3-1

3



เมื่อรพ.วินิจฉัยพบผู้ป่วยสงสัยหรือยืนยันโรคติดต่อนำโดยยุงลายให้รายงาน รพ.สต.หรือสถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ ภายใน 3 ชั่วโมง

3



เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ อสม.ร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายที่บ้านผู้ป่วยและใช้สเปรย์กระพ่นฉีดพ่นฆ่ายุงตัวแก่ภายในบ้านของผู้ป่วยภายใน 3 ชั่วโมง


1



ควบคุมโรคในพื้นที่ตามมาตรการที่กำหนดภายใน 1 วัน ดังนี้

- ❖ สำรวจและกำจัดลูกน้ำยุงลายบ้านผู้ป่วยและรัศมี 100 เมตร เป้าหมายค่า HI /CI เป็น 0
- ❖ เตรียมชุมชน ทำประชาคม และร่วมกำหนดมาตรการของชุมชนร่วมกัน
- ❖ พ่นสารเคมีกำจัดยุง ในรัศมี 100 เมตร โดย อปท.

มาตรการควบคุมโรคใช้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง day 1, 3, 7, 14, 21 และ 28





ปราบโรคจากยุงลาย ด้วยมาตรการ 6ป2ข.



ปลอดภัยจาก 3 โรคจากยุงลาย

- ✓ โรคไข้เลือดออก
- ✓ โรคติดเชื้อไวรัสซิกา
- ✓ โรคไข้ปวดข้อยุงลาย



มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อใน 7 ร.
คือโรงเรียน โรงธรรม โรงเรียน โรงพยาบาล โรงแรม โรงงาน และสถานที่ราชการ

สถานที่ราชการ



โรงงาน



โรงแรม



โรงพยาบาล




โรงเรียน



โรงเรียน



โรงธรรม



- สำรวจลูกน้ำยุงลายอย่างต่อเนื่อง
ทุกสัปดาห์
- ผลการสำรวจลูกน้ำยุงลาย
 $HI < 5$, $CI = 0$
- จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
สิ่งแวดล้อมและกำจัดแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลาย ทุกวันสำคัญของ
สถาบันพระมหากษัตริย์ และวัน
สำคัญทางศาสนา



THANK YOU

